

## 2 priedas. Daugiamečių gėlių kompozicijų, palankių vabzdžiams apdulkintojams, pavyzdžiai

### BALTŲ IR GELTONŲ ATSPALVIŲ GĖLYNAS



1. Vilnotoji notra (*Stachys byzantine*)



2. Rasakila (*Alchemilla epipsila*)



3. Rytinė laumenė (*Doronicum orientale*)



4. Blakstienotosios striepsnės (*Melica ciliata*)



5. Auksažiedis česnakas (*Allium moly*)



6. Tulpēs geltonais žiedais  
(Tulipa)



7. Ežiūolė hibridinė  
(Echinacea hybride  
„Sunrise“)



8. Mažoji viendienė  
(Hemerocallis minor)



9. Dailieji auskarėliai  
(Dicentra spectabilis  
„Alba“)



10. Paprastoji baltagalvė (Leucantemum  
vulgare)



11. Barzdėtasis vilkdalgis  
(Iris barbata elatior  
„Buteret popcorn“)



12. Baltasis kietis  
(Artemisia ludoviciana)



13. Sinavadas gesvais žiedais  
(Aquilegia Caerulea-Hybrid)



14. Vingiorykštinė  
kraujažolė (Achilea  
filipendulina)












15. Japoninė plukė (Anemone japonica)






## RAUSVŲ ATSPALVIŲ GĖLYNAS






	<p>1. Ežiuolė Ruby star</p>
	<p>2. Ežiuolė Augustkonigin</p>
	<p>3. Ežiuolė White swan</p>
<p>Gėlyną galima papildyti varpiniais ir svogūniniais anksti pavasarį žydinčiais augalais.</p>	<p>5. Gojinius šalavijas Schneehugel</p>
<p>4. Japoninė plukė Serenade</p>	






## ĮVAIRIOS DAUGIAMĖTĖS GĖLĖS MĖGSTAMOS VABZDŽIŲ APDULKINTOJŲ






Augalas	Savybės	Nuotrauka
<p>Monarda 'Pink Supreme'</p>	<p>Aukštis: apie 70 cm.                      Žydėjimo laikas: VII-VIII mėn.                      Žiedų spalva: ryškiai rožinė.                      Lapai: žali, aromatingi.                      Kitos pastabos: kvėpiantys žiedai.</p> <p>Drėgna, pusiau saulė</p>	
<p>Monarda 'Bee-Lieve'</p>	<p>Aukštis: 55 – 60 cm.                      Žydėjimo laikas: VII-VIII mėn.                      Aromatinga, kompaktiška</p>	
<p>Ežiuiolė 'Sunseekers White Perfection'</p>	<p>Aukštis: 50 - 60 cm.                      Žydėjimo laikas: VII-IX mėn.                      saulėta</p>	
<p>Ežiuiolė 'Mellow Yellows'</p>	<p>Aukštis: <b>70 – 80 cm.</b>                      Žydėjimo laikas: <b>VI-X mėn.</b></p>	






<p>Barškė 'Vanilla Cream'</p>	<p>Aukštis: 100 cm.          Žydėjimo laikas: VI-VII mėn.          saulėtoje vietoje, dirvožemiui nereiki. Tinka skynimui.          Dekoratyvi išlieka ir po žydėjimo.</p>	
<p>Didžioji astrancija 'Snow Star'</p>	<p>Aukštis: 80 cm          Žydėjimo laikas: VI-VIII mėn.          astrancijos veislė labai dideliais žiedais. Ilgaamžis augalas tinkantis skynimui. Auginama saulėtose ar pusiau pavėsingose vietose, pakankamai derlingose ir drėgnose dirvose.</p>	
<p>Didžioji astrancija 'Sparkling Stars Pink'</p>	<p>Aukštis: apie 60 cm.          Žydėjimo laikas: VI-IX mėn.          Dideli žiedai, pusiau pavėsis, saulė, derlinga, drėgna</p>	
<p>Burbulis 'Cheddar'</p>	<p>Aukštis: 60 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          saulėtoje vietoje ar daliniame pavėsyje, derlingesnėje drėgnoje dirvoje</p>	
<p>Burbulis 'New Moon'</p>	<p>Aukštis: 60 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          dideliais žiedais ant tvirtų, stačių stiebų. Ilgaamžis, tinkantis skynimui augalas. Geriausiai auga saulėtoje vietoje ar daliniame pavėsyje, derlingesnėje dirvoje. Gali augti ir drėgnesnėje vietoje</p>	







<p>Pilkasis snaputis 'Ballerina'</p>	<p>Aukštis: 20 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          Saulėta, pusiau saulėta, kompaktiški kereliai, laidu dirva</p>	
<p>Snaputis 'Johnson's Blue'</p>	<p>Aukštis: 25 – 30 cm.          Žydėjimo laikas: V mėn. pabaiga – VIII mėn          Gerai auga ir saulėje, ir pusiau pavėsyje. Dirvožemiui nereiklus. Nukirpus nužydėjusius žiedynus pražysta antrą kartą.</p>	
<p>Snaputis 'Rozanne'</p>	<p>Aukštis: 40 – 50 cm.          Žydėjimo laikas: VI-IX mėn.          birželio vidurio iki pat šalnų. Gerai auga ir saulėje, ir pusiau pavėsyje, tačiau mėgsta derlingesnę dirvą.</p>	
<p>Snaputis 'SUMMER SKIES'          Geranium pratense 'SUMMER SKIES'</p>		
<p>Vilkdalgis Žemaūgis</p>	<p>Aukštis: apie 30 cm.          Žydėjimo laikas: V mėn.          'Here Come the Clowns'</p>	







Vilkdalgis žemaūgis	Aukštis: apie 35 cm, Žydėjimo laikas: V mėn. 'Zero'	
Vilkdalgis žemaūgis	Aukštis: apie 30 cm. Žydėjimo laikas: V mėn. 'Cat's Eye'	
Vilkdalgis žemaūgis	Aukštis: apie 30 cm. Žydėjimo laikas: V mėn. 'Blend of Blue'	
Sibirinis vilkdalgis 'Ego'	Aukštis: 80 cm. Žydėjimo laikas: V mėn. pab. – VI mėn. labai gausiai žydinti sibirinio vilkdalgio veislė. Geriausiai auga saulėtoje vietoje, derlingesnėje dirvoje. Gali augti neužmirkančioje pakrantėje. Puikiai laikosi pamerkti.	
Vilkdalgis 'Fruit Cocktail'	Aukštis: apie 60 cm. Žydėjimo laikas: VI mėn. pr. miniatiūrinis aukštaūgis vilkdalgis (MTB).	




<p>Uolaskėlė 'Peach Melba'</p>	<p>Aukštis: 10 cm.          Žydėjimo laikas: V mėn.          Pusiau pavėsis</p>	
<p>Veronika 'Melanie White'</p>	<p>Aukštis: 90 cm.          Žydėjimo laikas: VII-VIII mėn.          geriausiai auga saulėtoje vietoje, laidžioje dirvoje.</p>	
<p>Plukė (Anemone leveillei)</p>	<p>Aukštis: 50 - 60 cm.          Žydėjimo laikas: IV-V mėn.          saulėtoje, ir pavėsingoje vietoje, dirvožemiui nereikli.</p>	
<p>Plukė lieknoji</p>	<p>Aukštis: 35 – 40 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          žydi gausiai, dideliais žiedais. Geriausiai auga daliniame pavėsyje.</p>	
<p>Plukė 'Rubra'</p>	<p>Aukštis: apie 30 cm.          Žydėjimo laikas: VI mėn.          labai dekoratyviai atrodo ir nužydėjusi. Puikiai auga ir saulėje, ir pusiau pavėsyje, dirvožemiui nereikli.</p>	

<p>Plukė 'Andrea Atkinson'</p>	<p>Aukštis: 80 – 100 cm.          Žydėjimo laikas: VIII – X mėn.          žydi iki šalnų, dideliais žiedais. Geriausiai auga daliniame pavėsyje, derlingesniame dirvožemyje.</p>	
<p>Paprastoji kraujažolė 'Salmon Beauty'</p>	<p>Aukštis: <b>apie 60 cm.</b>          Žydėjimo laikas: <b>VI-VIII mėn.</b></p>	
<p>Krantinė kraujažolė 'Silver Spray'</p>	<p>60 cm          Žydėjimo laikas: VII-VIII mėn.          Saulėta, derlinga, drėgna</p>	
<p>Notra 'Pink Cotton Candy'</p>	<p>Aukštis: 40 cm          Žydėjimo laikas: VII-VIII mėn.          kompaktiška</p>	
<p>Žiognagė 'Apricot Pearl'</p>	<p>Aukštis: 40 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          žiedai pusiau pilnaviduriai. Censation serijos žiognagė.</p>	


<p>Žiogmagė 'Smokey Peach'</p>	<p>Aukštis: 40 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          Žiedai pusiau pilnaviduriai. Censation serijos žiogmagė.</p>	
<p>Žiogmagė 'Cosmopolitan'</p>	<p>Aukštis: apie 40 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          "Cocktails" serijos žiogmagė.</p>	
<p>Žiogmagė 'Tempo Orange'</p>	<p>Aukštis: apie 40 cm.          Žydėjimo laikas: V-VII mėn.</p>	
<p>Baltažiedis čiobrelis</p>	<p>Aukštis: apie 5 cm.          Žydėjimo laikas: V-VII mėn.          Sudaro švelniai žalios spalvos puikiai augantį ir dirvą padengiantį visžalį kilimą. Aromatas nėra labai stiprus. Pakelia nedidelį mindžiojimą.</p>	
<p>Čiobrelis (Thymus longicaulis ssp. Odoratus)</p>	<p>Aukštis: apie 15 cm.          Žydėjimo laikas: V-VI mėn.          auga kilimėliu,          išskirtinis aromatas</p>	




<p>Erikinis astras 'Weisser Zwerg'</p>	<p>Aukštis: 70 cm.          Žydėjimo laikas: ruduo.          Pakelia šalnas</p>	
<p>Astras 'Oktoberkaskade'</p>	<p>Aukštis: 150 cm.          Žydėjimo laikas: X mėn          Saulėta, derlinga, neužmirkusi</p>	
<p>Krūminis astras 'Apollo'</p>	<p>Aukštis: 30 – 40 cm.          Žydėjimo laikas: IX-X mėn.          Tinka vazone</p>	
<p>Krūminis astras (<i>Aster dumosus</i> L.)</p>	<p>Aukštis: 30 – 40 cm.          Žydėjimo laikas: IX-X mėn.</p>	
<p>Tikroji levanda (<i>Lavandula angust.</i>)</p>	<p>Aukštis: 30 – 50 cm.          Žydėjimo laikas: VI-VIII mėn.          Saulėta vieta, neužmirkusi dirva</p>	
<p>Gojinis šalavijas <i>Salvia nemorosa</i></p>	<p>Aukštis: 30 – 60 cm.          Žydėjimo laikas: VI-VIII mėn.          Saulėta vieta, dirvai nereiklus</p>	

<p>Sinavadas paprastasis (<i>Aquilegia vulgaris</i>)</p>	<p>Aukštis: 40– 60 cm. Žydėjimo laikas: V mėn. Dalinis pavėsis, dirvai nereiklus, vidutinio drėgnumo, laidus vandeniui</p>	
<p>Kraujalakė vaistinė (<i>Sanguisorba officinalis</i>)</p>	<p>Aukštis: 80 cm Žydi VII-VIII mėn. <b>Vieta saulėta</b> Dirvožemis-laidus vandeniui, vidutinio derlingumo</p>	
<p>Dailieji auskarėliai <i>Dicentra spectabilis</i></p>	<p>Aukštis: 50-70 cm Žydi V-VI mėn. Vieta pusiau šešėlinga ar šešėlinga Dirvožemis- vidutinio drėgnumo, derlingas, humusingas Gali būti sodinami po dideliais krūmais ar medžiais. Puikiai tinka pavėsio gėlynams kaip šviesus akcentas</p>	
<p>Paprastoji baltagalvė (<i>Leucanthemum vulgare</i>)</p>	<p>Aukštis: 50-70 cm Žydi VI-VII mėn. Dirvožemiui nereikli, vieta saulėta</p>	
<p>Švelnioji rasakila (<i>Alchemilla mollis</i>)</p>	<p>Aukštis: 60 cm Žydi VI-VII mėn. Auga sunkesnėje dirvoje, tiek saulėtoje vietoje, tiek ir pusiau pavėsyje.</p>	
<p>Rytinė laumenė (<i>Doronicum orientale</i>)</p>	<p>Aukštis: 30-50 cm Žydi V mėn. <b>Vieta saulėta ar pusiau saulėta</b> Dirvožemis drėgnokas derlingas</p>	

<p>Auksažiedis česnakas (<i>Allium moly</i>)</p>	<p>Aukštis: 20– 25 cm. Žydėjimo laikas: VI mėn. Vieta saulėta ir pusiau pavėsis</p>	
<p>Mažoji viendienė (<i>Hemerocallis minor</i>)</p>	<p>Aukštis: 50 cm. Žydėjimo laikas: VI -VIII mėn. Vieta saulėta ir pusiau pavėsis</p> <p>Viendienės– ilgai žydinčios, ilgaamžės gėlės, pasižyminčios didžiule spalvų ir formų įvairove. Geriausiai sodinti saulėtoje vietoje, bet pakenčia ir pusiau pavėsj. Jas retai pažeidžia ligos, dirvai nėra reiklios, tačiau purioje, derlingoje, atrodys daug vešlesnės ir dekoratyvesnės.</p>	
<p>Vingiorykštinė kraujažolė (<i>Achillea filipendulina</i>)</p>	<p>Aukštis: 70– 80 cm. Žydėjimo laikas: VI mėn. Visiškai nereiklus augalas, tinka net ir nederlinga, sausoka dirva. Mėgsta saulėtas vietas.</p>	






#### Varpiniai žoliniai augalai


Augalas	Savybės	Nuotrauka
<p>Soruolė pašiaušėlinė 'Red Head'</p>	<p>Aukštis: 90 cm. Žydėjimo laikas: IX-X mėn. saulė ir laidus dirvožemis. Nukirpti geriau anksti pavasarį.</p>	

<p>Mėlynlapė poavižė 'Saphirsprudel'</p>	<p>Aukštis: apie 50 cm be varpų ir apie 1 m su varpomis.          Žydėjimo laikas: VI-VII mėn.          saulėtoje vietoje, lengvoje dirvoje. Puikiai pakelia sausras.</p>	
<p>Rykštėtoji sora 'Heavy Metal'</p>	<p><b>Aukštis:</b> apie 1,5 m.  <b>Žydėjimo laikas:</b> VIII-IX mėn.  <b>Varpos:</b> rausvos.  <b>Lapai:</b> melsvi, visiškai statūs.  <b>Kitos pastabos:</b> suauga dailiais, kompaktiškais, stačiais kerais.</p>	
<p>Rykštėtoji sora 'Black and Light'</p>	<p><b>Aukštis:</b> apie 80 cm.  <b>Žydėjimo laikas:</b> VII-X mėn.  <b>Varpos:</b> raudonos.  <b>Lapai:</b> vasarą žali su ryškiai raudonais galais, kurie rudeniop vis labiau rausta ir raudonai nusidažo didžioji dalis lapų.  <b>Kitos pastabos:</b> geriausiai auga saulėtoje vietoje, dirvožemiui nereikli. Auga kompaktiškais, dailiais kereliais.</p>	

<p>Melsvoji melvenė 'Heidezwerg'</p>	<p><b>Aukštis:</b> 55 cm.  <b>Žydėjimo laikas:</b> VIII-X mėn.  <b>Varpos:</b> rudos.  <b>Lapai:</b> tamsiai žali, rudenį nusidažo auksine spalva.  <b>Kitos pastabos:</b> auga gana stačiu, tik truputį svyrančiu keru ir saulėje, ir pusiau pavėsyje. Mėgsta drėgnesnę derlingą dirvą, tačiau puikiai auga ir skurdesnėje dirvoje, tik bus šiek tiek žemesnė.</p>	
<p>Eraičinas 'Walberla'</p>	<p><b>Aukštis:</b> 30 cm.  <b>Žydėjimo laikas:</b> VI-VII mėn.  <b>Varpos:</b> rusvos ant raudonų stiebų.  saulėta</p>	
<p>Kupstinis barzdūnas JS 'Red Frost'</p>	<p><b>Aukštis:</b> apie 1 m.  <b>Lapai:</b> vasarą melsvai žali, rudenį nusidažo bordo ir raudonais atspalviais.</p>	

UNKSMEMĖGIAI DAUGIAMEČIAI ŽOLINIAI AUGALAI

Augalas	Savybės	Nuotrauka
Paparčiai	Kelminis papartis ( <i>Dryopteris filix-mas</i> ) Žvynuotasis papartis ( <i>Dryopteris affinis</i> )	
Įvairios melsvės ( <i>Hosta</i> )		
Mažoji žiemė ( <i>Vinca minor</i> )		
Hakonė ( <i>Hakonechloa</i> )		
Snapučiai Geranium	Geranium macrorrhizum 'SPESSART' Geranium himalayense 'BABY BLUE'	

<p>Astilbēs arendso</p>	<p>Astilbe x arendsii 'FANAL' Astilbe arendsii 'BUMALDA'</p>	
<p>Pakalnutēs (Convallaria majalis L.)</p>		